

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 1 au BULLETIN N° 92 de MAI 1968

8 Mai 1968

V I G N E

INFORMATIONS

Rougeot parasitaire ou Brenner

Nous rappelons notre mise en garde du 25 avril. Dans le cas où un traitement aurait été appliqué avant le 4 mai, son renouvellement est nécessaire.

Dégâts de grêle

Dans toutes les vignes qui pourraient être touchées par la grêle, un traitement fongicide doit être appliqué le plus tôt possible pour éviter l'installation de divers champignons secondaires sur les plaies.

A R B R E S F R U I T I E R S

AVERTISSEMENT

Tavelures Pommier - Poirier

Les pluies importantes qui ont eu lieu les 4 - 5 et 6 avril ont lavé le traitement préconisé au début du mois ; on doit considérer qu'à l'heure actuelle celui-ci n'assure plus aucune protection des arbres.

Malgré les difficultés que peut représenter le traitement des vergers en cette période pluvieuse, il faut envisager une intervention dès que l'on constatera une amélioration du temps pendant quelques heures.

INFORMATIONS

Oïdium du pommier

Poursuivre activement la suppression des pousses oïdiées, en plus de toute application fongicide.

/...

P 245

Araignées rouges (Panonychus ulmi)

Des éclosions ont eu lieu mais celles-ci s'effectuent lentement.

Un premier traitement ne pourra être exécuté dans le verger qu'au retour d'une période clémente.

Apporter beaucoup de soin à l'exécution de ce traitement que l'on utilise soit un insecticide acaricide de contact ou systémique, soit un acaricide spécifique.

Puceron vert du pommier ou autres espèces

Surveiller attentivement le verger et n'intervenir qu'au retour du beau temps si la présence de ceux-ci est reconnue. On pourra utiliser soit un aphicide de contact, soit un endotherapique.

G R A N D E C U L T U R E

INFORMATIONS

Charançon des siliques sur colza d'hiver

Un temps particulièrement instable et pluvieux n'a pas permis la réalisation du traitement préconisé contre le charançon des siliques pendant la période du 1er au 7 mai. Ces conditions climatiques ont heureusement réduit l'activité du parasite et limité les dommages.

Si une amélioration survient très prochainement, une intervention présente encore un certain intérêt jusqu'au 12 mai. Passé cette date, hormis quelques rares cultures plus tardives, les colzas, en défloraison, ne justifieront plus le traitement.

Mildiou de la pomme de terre

Sur repousses, dans les tas de déchets de pommes de terre de la dernière récolte, des taches de mildiou doivent apparaître prochainement.

Il est rappelé que ces tas constituent la source la plus importante de contamination des cultures. Ils doivent donc être soigneusement détruits. Le traitement des tas avec un défanant est insuffisant par suite de l'apparition rapide de nouvelles repousses.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytop sanitaire CHAMPAGNE